




Immagine aerea tratta da Google Maps: si vede la vegetazione del parco settentrionale, da sopra la strada costiera a sotto via Beirut, confine del parco. Si riconoscono casa Jelinek e casa Radonetz.


Nella zona a monte della strada costiera due fasce di parco, lunghe circa 100 metri e larghe 5-10 metri, sono state completamente disboscate, a tabula rasa, nei primi mesi del 2014. Non si conoscono le motivazioni dell'intervento.

Nel gennaio 2014, prima della drastica tagliata, la vegetazione di conifere e latifoglie risultava sana e rigogliosa: le foto aeree tratte da Google Maps, di alcuni anni prima, confermano l'impressione di una continuità di piante sane.

Bisogna osservare che, dopo il taglio totale della vegetazione di un terreno, dovrebbero seguire azioni pianificate come un impianto di nuove essenze e l'inserimento di un sistema di irrigazione. Infatti il terreno, se abbandonato a sé stesso, assume le caratteristiche di un suolo degradato: i ceppi delle latifoglie ricacciano polloni dal basso, erbacce e rovi crescono velocemente e, soprattutto, si espandono incontenibili piante infestanti come le acacie e gli ailanti. L'ailanto, di cui si è già parlato per altre zone del parco, può raggiungere in tre anni l'altezza di ben 5 metri.

Attualmente in queste due aree ormai degradate si sta verificando, come prevedibile, proprio questa situazione: si sta sviluppando una vegetazione spontanea infestante incontrollata.

Le ramaglie abbandonate dopo i tagli nella fascia lungo via Beirut accrescono l'immagine di degrado.



IL PARCO OLTRE LA STRADA COSTIERA E LUNGO VIA BEIRUT

LA ZONA OLTRE LA STRADA COSTIERA



Taglio della vegetazione a tabula rasa; si intravedono i ceppi rimasti (aprile 2014). In pochi mesi, ricrescita di vegetazione tipica dei terreni degradati: acacie, ailanti ed erbe infestanti (ottobre 2014).

LA ZONA LUNGO VIA BEIRUT



Taglio totale, a nostro parere ingiustificato, di latifoglie e conifere dietro casa Radonetz e lungo la fascia del confine del parco (gennaio-aprile 2014).



Ricrescita vigorosa della vegetazione con acacie, ailanti, rovi e nuovi polloni dai ceppi delle latifoglie tagliate (giugno-ottobre 2014).